

泰州市地方标准

DB3212/T 2094 — 2025

蛋鸡生产中兽药保健技术规范

Technical specification for Chinese veterinary medicine health care in laying hens
production

2025-02-06 发布

2025-03-06 实施

泰州市市场监督管理局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏农牧科技职业学院提出。

本文件由泰州市农业农村局归口。

本文件由江苏农牧科技职业学院、泰兴市畜牧兽医中心负责具体技术内容的解释。

本文件起草单位：江苏农牧科技职业学院、泰兴市畜牧兽医中心。

本文件主要起草人：王永娟、徐晓军、赵冬、顾琪、董亚青、孙谦、冀忠恩、蔡丙严、袁橙、夏爱鸿、郭方超、殷洁鑫、林钟鸣、程辉、孙军华、叶渊、刘剑华。

蛋鸡生产中兽药保健技术规范

1 范围

本文件规定了蛋鸡生产中兽药保健的基本饲养条件、中兽药要求、日常管理要求、使用原则、使用方法、用药规范、记录和档案管理。

本文件适用于蛋鸡养殖场的中兽药临床保健。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY/T 472 绿色食品 兽药使用准则

NY/T 1338 蛋鸡饲养 HACCP 管理技术规范

NY/T 2664 标准化养殖场 蛋鸡

NY/T 5030 无公害农产品 兽药使用准则

NY 5041 无公害食品 蛋鸡饲养兽医防疫准则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中兽药 Chinese Veterinary Medicine

以中药材为原料，用于防治动物疾病、提高蛋鸡生产性能和改善动物产品品质的中药制品。

3.2

蛋鸡 Layer

人工养殖的长大后用于生产供人类食用蛋的鸡。

4 饲养条件

蛋鸡养殖场建设按照 NY/T 2664 执行，蛋鸡饲养管理规范按照 NY/T 1338 执行，蛋鸡饲养防疫管理按照 NY 5041 执行。

5 中兽药要求

5.1 合规性与质量标准

中兽药的购买和使用应遵循 NY/T 5030 规定，并持有相应的批准文号。药品质量应符合《中华人民共和国兽药典》以及《兽药质量标准》的要求。

5.2 产品信息核对

在购买中兽药时，使用者应使用国家兽药综合查询系统扫描产品二维码，以核实产品的基本信息。这

些信息包括但不限于生产企业、产品名称、批准文号、生产日期和有效期等。

5.3 包装与性状检查

中兽药的外观包装应保持完好无损，性状应保持原状，不应出现涨袋（瓶）、结块等异常现象。

6 日常管理要求

6.1 健康养殖要求

6.1.1 密度管理

规定笼养饲养密度不应超过 8 只/m²，每只鸡至少应有 18cm 的栖架空间，以满足其活动需求。

6.1.2 水源管理

根据不同季节调整水箱压力，保证充足饮水；定期消毒水线；控制育雏期和产蛋期的饮水温度。

6.1.3 饲喂管理

确保每次加料前上次的饲料已清空；给药前减少 1 次喂料；注射免疫前控制饲料量。

6.1.4 抗应激培养

适当提高鸡只的抗应激能力，特别是对冷和惊吓的适应能力。

6.2 环境管理要求

6.2.1 照明

鸡舍应配备足够的照明设施，确保光照均匀，必要时引入自然光照；确保蛋鸡在产蛋高峰期至少获得 15h 的光照，并在高峰期结束后每天增加 0.5h，500d 后每天再增加 0.5h。

6.2.2 通风和湿度

鸡舍应通风良好，舍内空气质量、有害成分应符合 NY/T 388 的要求，二氧化碳浓度不高于 0.3%；湿度应控制在 50%~70%。

6.3 用药管理要求

6.3.1 预防用药

坚持能不用药则不用药原则，必须预防时应避免极端寒凉的药物组方，以温和调理为主，保持鸡只体内环境的稳态平衡，促进肝脾功能的正常运转。

6.3.2 综合防治

坚持“预防为主，早发现早治疗”的原则，提前采取预防措施，一旦出现异常鸡只及时调理治疗，降低鸡群感染率和发病率。

7 使用原则

7.1 育雏（1 周~4 周）

以强健机体、提高免疫力为主。

7.2 育成（5 周~17 周）

以促进消化、提高免疫力为主。

7.3 开产（18周～20周）

以促进新陈代谢、维持免疫功能正常运行为主。

7.4 产蛋持续期（21周～45周）

以保持新陈代谢正常速率、延缓器官功能减退速度、预防输卵管炎为主。

7.5 产蛋回落期（46周之后）

以缓解机体脏器、生殖系统衰老、降蛋白为主。

7.6 淘汰期（淘汰前一月）

以促进消化、增加体重为主。

8 使用方法

8.1 人员要求

应按照 NY/T 472 要求，在执业兽医师或相关专业人员指导下使用。使用处方药时，须由执业兽医师开具处方。

8.2 信息核实

使用者应按照中兽药标签和说明书要求使用，包括给药途径、剂量、疗程、动物种属、适应症等。

8.3 适应症

依据蛋鸡生长阶段的特点，应选用适宜的中兽药；对于急性、传播迅速且致死率高的疫病，推荐使用口服液、合剂、可溶性粉或可溶性颗粒剂型，并通过饮水给药的方式进行；而对于发病缓慢、传播速度慢、死亡率低且采食量无显著下降的疫病，更适合选择散剂，并以饲料添加的方式给药。

8.4 使用方法

8.4.1 口服液或合剂

用前应充分摇匀，兑水饮用或均匀喷涂于饲料表面。

8.4.2 可溶性粉或可溶性颗粒

应先加适量清洁水充分溶解，再加入饮水桶内，混匀后饮用或均匀喷涂于饲料表面。

8.4.3 可溶性粉或散剂

与少量粉料混匀后，再充分混入粉料饲料中使用，不适合与颗粒料直接混合使用。

8.5 配伍与禁忌

8.5.1 中兽药+中兽药

在蛋鸡出现混合性感染或同时出现两种及以上严重症状时，应选择主治功能相匹配的两种或多种中兽药进行联合治疗。

8.5.2 中兽药+化药

在蛋鸡发生死亡率高且病原体明确的疾病时，应选用主治功能相匹配的中兽药，并配合使用对病原体敏感或对症的化学药物。

8.5.3 配伍禁忌

应避免混合使用存在配伍禁忌的药物，以防有效成分分离、沉淀，从而降低药效或引起毒副作用。

8.6 使用剂量

按所用中兽药说明书使用。

8.7 疗程

8.7.1 清热解毒药、利尿通淋药

用药一般以 3d~5d 为一个疗程，若疗效显著但疾病未完全康复，可继续下一个疗程，直至病情稳定后停药。对于补中益气药和健脾消食药，建议连续用药 5d~7d 为一个疗程。为加强治疗效果，可以连续 2 个~3 个疗程，疗程之间建议间隔 5d~7d。

8.7.2 常用中兽药代表药物

预防保健用蛋鸡中兽药的选用，参见附录表 A.1；治疗用蛋鸡中兽药的选用，参见附录表 B.1。同时应做好蛋鸡及其产品药残和重金属含量的监测。

9 记录与档案保存

9.1 入库、出库记录

采购中兽药后，由专业人员按药品库管理要求保管。出库时遵循先进先出原则，防止药品过期失效。入库和出库信息记录包括购入日期、商品名称、通用名称、主要成分、生产单位、批准文号、生产批号、有效期、贮存条件及出库日期、经办人等信息。

9.2 用药记录

记录应包含以下详细信息：药物来源、使用日期、药品的商品名与通用名、产品批准文号、生产批号、群体用药的具体信息（圈号、数量、日龄）、个体用药的具体信息（日龄、编号）、使用方法、总使用量、休药期以及停药日期。在整个饲养周期中，需保持用药记录的完整性，并确保所有记录统一归档保存。

9.3 诊疗记录

包括使用中兽药的蛋鸡品种、日龄、规模、发病时间、临床症状、诊断结论、用药情况、治疗效果等。

9.4 档案保存

养殖场按《畜禽标识和养殖档案管理办法》的规定进行中兽药使用的记录与档案保存。中兽药购入、使用记录档案保存时间应在蛋鸡淘汰后，不低于 2 年；蛋种鸡相关记录档案应长期保存。

附 录 A

(资料性)

预防性蛋鸡用中兽药选用

预防性蛋鸡用中兽药选用见表 A. 1。

表 A. 1 预防性蛋鸡用中兽药选用

用途	代表药物	注意事项
提高免疫效果	人参茎叶总皂苷	按产品说明书要求使用，不宜与疫苗混合使用
	扶正解毒散	
提高免疫力	黄芪多糖注射液	按产品说明书要求使用
促进生长	健鸡散	按产品说明书要求使用
	黄芩提取物	
促进产蛋	蛋鸡宝	1. 不适于温热病发病期引起的产蛋下降 2. 适当延长光照时间、提高营养水平
	降脂增蛋散	
	激蛋散	
防暑热	解暑抗热散	1. 注意夏季鸡舍的降温与通风 2. 供应充足、清洁的饮水
	清暑散	
	香薷散	
驱虫与止痢	鸡球虫散	1. 注意蛋鸡与粪便的隔离 2. 保持环境卫生
	穿白痢康丸	
	四黄止痢颗粒	

附 录 B

(资料性)

治疗性蛋鸡用中兽药的选择

治疗性蛋鸡用中兽药的选择见表 B. 1。

表 B. 1 治疗性蛋鸡用中兽药的选择

证型		临床症状	代表药物	注意事项
温热证	轻证	精神沉郁，拉稀，采食量下降，饮水量增加，产蛋下降	双黄连口服液	1. 保持舍内空气清新，饮水足够、新鲜 2. 补充多种维生素和电解质
			板青颗粒	
	重证	精神沉郁，采食量急剧下降或废绝，饮水量猛增，排水样绿色或黄白色稀便，体温升高，气喘；冠髯发绀、痉挛、抽搐，甚至突然死亡等	清瘟败毒片/散	1. 保持舍内空气清新，饮水足够、新鲜 2. 补充多种维生素和电解质 3. 配合健脾类中药，帮助恢复采食量
			黄连解毒片/散	
			麻杏石甘片/散	
			茵陈提取物	
感冒	风寒感冒	畏寒，采食量减少，饮水量减少，流鼻涕、泪液，拉稀等	荆防败毒散	1. 保持舍内温度适宜 2. 保持空气清新
	风热感冒	怕热，饮水量增加，采食量减少，声音嘶哑等	银翘散	1. 保持舍内凉爽、空气清新 2. 饮水清凉、充足
			板青颗粒	
			藿香正气口服液	
			茵陈提取物	
咳喘	轻证	精神差，采食量降低；甩头，流鼻涕，咳嗽，气喘，有明显痰鸣音	葶苈子	1. 保持舍内空气清新 2. 必要时可配合对症化药
			麻黄鱼腥草散	
			金荞麦	
			金荞麦片	
	重证	采食量严重下降，鸡舍内有明显尖叫声，头部肿胀，冠髯发绀，急性死亡等	清肺止咳散	1. 保持舍内空气清新 2. 配合清瘟解毒口服液或化痰化药治疗
			喉炎净散	

表 B.1 治疗性蛋鸡中兽药的选择用（续）

证型		临床症状	代表药物	注意事项
淋证、痛风		精神沉郁，采食量减少或废绝，饮水量增加，鸡冠萎缩，趾爪干枯，排大量灰白色或白色、腥臭稀便；趾跗关节肿大，行走困难，蹲伏等	海金沙	1. 降低饲料蛋白含量 2. 停用肾毒性药物 3. 控制用药时间，以症状缓解为判断标准 4. 供应充足饮水，补充维生素和电解质
泄泻		消瘦，冠髯苍白，采食量降低，排稀便或料便，无明显臭味	健鸡散	慎用清热类中药
			四黄止痢颗粒	
湿热下痢	轻证	精神沉郁，采食量降低，排腥臭稀便或溏便	白头翁	1. 保持舍内良好通风 2. 及时清除舍内粪便
			穿白痢康丸	
			杨树花口服液	
			四黄止痢颗粒	
	重证	体温升高，采食量降低，饮水量增加，冠髯苍白，粪便带血，尾羽粘黏带血粪便	白头翁散	1. 配合维生素 K3 等止血药治疗 2. 适当配伍敏感抗生素 3. 及时清除鸡舍粪便
			鸡球虫散	
脂肪肝		体重超标，腹部下垂，产蛋率降低，甚者突然死亡	茵陈	1. 降低饲料能量水平 2. 饲料中添加适量的氯化胆碱
			茵陈提取物	
			黄连解毒片/散	